

ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата «ЦЕФАЛЕКСИН 15 %»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Цефалексин 15 %(Cefalexin 15 %).
- 1.2 Цефалексин 15 % - противомикробный препарат, представляющий собой маслянистую жидкость от белого до светло-желтого цвета.
- В 1 мл препарата содержится 150 мг цефалексина моногидрата.
- 1.3 Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 20,0; 50,0; и 100,0 мл.
- 1.4 Цефалексина 15 % - хранят по списку Б в сухом месте, при температуре от +5°C до +25°C.
- Срок годности - 2 года от даты изготовления.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- 2.1 Цефалексин 15 % - антибиотик широкого спектра действия, препятствует синтезу клеточной стенки бактерий ингибируя фермент транспептидазу, вызывая нарушение осмотического баланса и гибель клетки. Препарат активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в т. ч., Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, Pasteurellamultocida, Haemophilus somnus, Haemophilus parasuis, Fusobacterium necrophorum, Bacteroides spp., Actinobacillus pleuropneumoniae, Escherichia coli, Salmonella choleraesuis, Salmonella typhimurium, Proteus mirabilis, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.
- 2.2 Препарат быстро всасывается из места введения, достигая максимальной концентрации через 1,5-2 часа после инъекции. Выводится из организма в основном с мочой, частично с желчью.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

- 3.1 Цефалексин 15% применяют крупному, мелкому рогатому скоту, свиньям, собакам и кошкам для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, мочеполовой системы, кожных инфекций, вызываемых чувствительными к препарату микроорганизмами.
- 3.2 Препарат перед применением встряхивают и вводят животным внутримышечно в течение 5 дней с интервалом 12-24 часа в следующих дозах:
- Крупный рогатый скот: 1 мл на 15-20 кг живой массы.
- Козы, овцы, свиньи, собаки и кошки: 1,0 мл на 15 кг живой массы.
- 3.3 Побочное действие. В редких случаях могут возникать тошнота, рвота, диарея, могут наблюдаться аллергические реакции. У кошек препарат может вызвать повышение температуры, у собак - повышенную возбудимость и слюнотечение.
- 3.4 Противопоказания. Не применять препарат для беременных животных, поскольку он проникает через плацентарный барьер и животным, у которых Цефалексин ранее вызывал повышенную возбудимость.
- 3.5 Препарат не следует применять с парентеральными аминогликозидами и другими нефротоксичными средствами (амфотерицин В и др.).
- 3.6 Сроки ожидания. Убой животных па мясо допускается не ранее, чем через 4 дня, после прекращения применения препарата. Молоко допускается к использованию в пищу людям через 3 дня после последнего введения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления плотоядных животных. Молоко, полученное в период лечения препаратом и до истечения 3 дней после последнего применения, может быть использовано для кормления животных.

4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

- 4.1 При работе с препаратом следует соблюдать меры личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные для работы с ветеринарными средствами.
- 4.2 При случайном попадании препарата в глаза следует промыть водой в течение 15 минут. При случайном попадании на кожу, смыть водой с мылом.
- 4.3 Лицам, проявляющим повышенную чувствительность к цефалоспорином, следует избегать прямого контакта с препаратом.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие нормативным документам.

6. ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

6.1 «Центровет» (Centrovvet LTDA), Чили.



Agrimatco