

# **ВЕРМИК 1%** инъекционный раствор

## **VERMIC 1%**

### **СОСТАВ**

100 мл содержат: Ивермектин 1 г.

### **ПОКАЗАНИЯ**

Вермик назначают с профилактической и лечебной целью крупному рогатому скоту и овцам при диктиокаулезе, остертагиозе, гемонхозе, трихостронгилезе, коопериозе, хабертиозе, протостронгилезе, эзофагостомозе, нематодирозе, буностомозе, стронгилоидозе, телязиозе, сифункулятозах, гиподерматозе, эстрозе, псороптозе, саркоптозе и хориоптозе; свиньям — при аскаридозе, эзофагостомозе, трихоцефалезе, стронгилоидозе, метастронгилезе, саркоптозе и гематопинозе.

### **ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Вермик вводят животным только подкожно с соблюдением правил асептики и антисептики крупному рогатому скоту в область предплечья, овцам и свиньям в область затылка. Препарат применяют однократно в следующих дозах: крупному рогатому скоту и овцам — 1 мл вермика на 50 кг веса животного, что соответствует 0,2 мг ивермектина на 1 кг массы животного, свиньям — 1 мл вермика на 33 кг веса животного, что соответствует 0,3 мг ивермектина на 1 кг массы животного. При введении раствора в объеме, превышающем 10 мл, инъекции проводят в несколько мест. В тяжелых случаях заболевания овец псороптозом проводят повторную обработку животных вермиком через 7 – 10 дней после первоначального введения препарата. С профилактической целью обработку животных при нематодозах проводят перед постановкой на стойловое содержание и весной перед выгоном на пастбище, против оводовых инвазий — сразу после окончания лета оводов, при саркоптоидозах и энтомозах — по показаниям. Каждую партию препарата предварительно испытывают на небольшой группе (7 – 10 голов) животных. При отсутствии осложнений в течение 3 дней приступают к обработке всего поголовья.

### **ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ**

КРС – 21 день, МРС – 30 дней, Свиньи – 28 дней.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** 3 года со дня изготовления.

Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей и животных месте при температуре от 5°C до 30°C.

После вскрытия флакона препарат можно использовать в течение 21 дня.

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Не разрешается использовать дойным, ослабленным и истощенным животным, а также беременным самкам менее чем за 28 дней до начала лактации.

### **УПАКОВКА**

Флаконы объемом 25 мл, 50 мл и 100 мл.

### **ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.**

**ЧИЛИ, CENTROVET** [www.centrovet.com](http://www.centrovet.com)