

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата «Ветерин 30% инъекционный раствор»

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Ветерин 30% инъекционный раствор – Veterinum 30% solution for injection.
- 1.2 Ветерин 30% инъекционный раствор – противомикробный препарат, представляющий собой раствор светло-желтого цвета. В 1 мл препарата содержится 300 мг флорфеникола.
- 1.3 Препарат выпускают во флаконах по 25, 50 и 100 мл.
- 1.4 Ветерин 30% инъекционный раствор – хранят по списку Б в сухом месте, при температуре от +5°C до +25°C.
- 1.5 Срок годности – 2 года от даты изготовления.

### 2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- 2.1 Флорфеникол – это синтетический антибиотик широкого спектра действия, оказывает бактериостатическое действие и действует посредством связывания с рибосомными субъединицами 50S и посредством ингибирования синтеза бактериального белка. Препарат активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в т.ч.: *Pasteurella* spp., *Haemophilus* spp., *Mycoplasma* *hyopneumoniae*, *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Klebsiella* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Moraxella* spp., *Fusobacterium necrophorum* и *Bacteroides melaninogenicus*.
- 2.2 Флорфеникол хорошо всасывается из места введения и быстро распределяется в организме. Препарат частично метаболизируется в печени, выводится в основном с мочой.

### 3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

- 3.1 Ветерин 30% инъекционный раствор применяют крупному и мелкому рогатому скоту для лечения заболеваний органов дыхания, интердигитального некробациллеза, инфекционного кератоконъюнктивита, и свиньям для лечения заболеваний дыхательных путей, вызываемых чувствительными к препарату микроорганизмами.
- 3.2 Крупному рогатому скоту препарат вводят внутримышечно в область шеи, в дозе 1 см<sup>3</sup> на 15 кг живой массы, но не более 10 мл в одно место, 2 раза с интервалом 48 часов.  
Мелкому рогатому скоту препарат вводят внутримышечно в область шеи, в дозе 1 см<sup>3</sup> на 15 кг живой массы, но не более 10 мл в одно место, 2 раза с интервалом 48 часов.  
Свиньям препарат вводят внутримышечно в область шеи, в дозе 1 см<sup>3</sup> на 20 кг живой массы, но не более 10 мл в одно место, 2 раза с интервалом 48 часов.
- 3.3 Побочное действие. Иногда наблюдается снижение аппетита, понос, покраснение и отек в месте инъекции.
- 3.4 Противопоказания. Повышенная чувствительность к флорфениколу. Не применять в период беременности и лактации, взрослым быкам-производителям и хрякам-производителям в период случки.
- 3.5 Препарат не следует применять с хлорамфениколом и тиамфениколом. Не смешивать с другими препаратами.
- 3.6 Сроки ожидания. Убой животных на мясо допускается не ранее, чем через 30 дней после прекращения применения препарата для крупного и мелкого рогатого скота и 14 дней после прекращения применения препарата для свиней.

### 4 МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

- 4.1 При работе с препаратом следует соблюдать общепринятые правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные для работы с ветеринарными средствами.
- 4.2 Лицам, проявляющим повышенную чувствительность к флорфениколу, следует избегать прямого контакта с препаратом.

### 5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и об этом сообщают в ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр», г. Минск, ул. Красная, 19а, тел. 290-42-79. Одновременно в ГУ «Белгосветцентр» высылают не менее 3-х невскрытых упаковок препарата данной серии с подробным описанием осложнений.

Инструкция по применению Ветерин 30% инъекционный раствор подготовлена сотрудниками УО «Витебская ордена»Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» А.А.Вербицким, И.В.Фомченко на основании документов, представленных заявителем.



# Agrimatco